

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>)	Adexar	W,T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	Bekämpfungszeitraum Ende der Bestockung bis Spitzen des Fahnenblattes nach der Hauptinfektionsperiode. Infektionsgefahr bei längeren feuchtkühlen Witterungsperioden. Warndiensthinweise beachten. Ausbringung in Kombination mit Wachstumsreglern ist möglich. Die aufgeführten Präparate wirken zugleich gegen zahlreiche Blattkrankheitserreger.
	Adexar-Amistar Opti Pack	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,4 + 1,4 l	
	Adexar-Diamant Pack	W,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,1 + 1,1 l	
	Ascra Xpro	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
			G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW701	F	
	Aviator Xpro	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l	
	Aviator Xpro Opti = Aviator Xpro + Amistar Opti	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW706, NG331	F	1,0 + 1,5 l	
	Capalo	W	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW701	F	2,0 l	
	Cerix	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	2,5 l	
	Champion	W,G,R	07, 08, 09	NW 5(0/0/0)m NW701	F	1,5 l	
	Champion-Diamant-Doppelgebinde	W,G,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	0,9 + 0,9 l	
	Cirkon	WW	07, 09	NW 5(0/0/0)m	35	1,1 l	
	Eleando	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	3,0 l	
Fandango	W,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,5 l		
		G	05, 07, 08,	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,25 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Halmbruchkrankheit (<i>Pseudo-cercospora herpotrichoides</i>)	Fandango-Input Spezial	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	0,75 + 0,75 l	
	Input Classic	W,G,R	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Mirage 45 EC	WG	09	NW 10(5/5/0)m NW705	F	1,2 l	
	Proline, Curbatur	W,G,R	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,8 l	
	Siltra Xpro	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l	
	Unix	W,G,R,T	09	NW 15(10/5/5)m NW706	F	1,0 kg	
	Unix Plexeo Pack	W,G,R,T	02, 05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	F	0,5 kg + 1,0 l	
	Vegas-Proline Pack	W,G,R	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,25 + 0,8 l	
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Adexar	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	Im Frühjahr zu Epidemiebeginn bis spätestens zur Getreideblüte. Agent, Capalo, Corbel, Gladio, Opus Top, Pronto Plus, Property 180 SC, Talius, Unix und Vegas werden schnell aufgenommen, daher wenig abhängig von Temperatur und nachfolgenden Niederschlägen.
	Adexar-Amistar Opti Pack	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,4 + 1,4 l	
	Adexar-Diamant Pack	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,1 + 1,1 l	
	Agent	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 20(10/5/5)m NW706, NT102	F	1,0 l	
	Amistar Opti Gladio	W,G,T	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/10)m NW706, NW712 NG331	F	1,8 + 0,6 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Aviator Xpro	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l G: 1,0 l	
	Ascra Xpro	W,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW706	F	1,2 l	
	Aviator Xpro Opti = Aviator Xpro + Amistar Opti	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW706, NG331	F	1,0 + 1,5 l	
	Bontima	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m, NG342-1	F	2,0 l	
	Capalo	W,G,T	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW701	F	2,0 l	
	Ceralo	W,G,R,T	05, 06, 08, 09	NW 20(15/15/10)m NW706	F	1,2 l	
	Cerix	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	2,5 l	
	Champion-Diamant- Doppelgebinde	W,G,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	0,9 + 0,9 l	
	Corbel	W,G,R	07, 08, 09	NW -(-/15/5)m NW701	F	1,0 l	
	Diamant	W,G,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,75 l	
	EpoXion Top	W	05, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706, NW712	F	2,5 l	
	Fandango	W,G,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
	Fandango-Input Spezial	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	0,75 + 0,75 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Gigant	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NG342-1	F	1,0 l	Für Gladio liegt eine Genehmigung für die Anwendung in Winterhafer gegen Echten Mehltau vor.
	Gigant Opti = Gigant + Zakeo Opti	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l	
	Gladio	W,G,T, WH	05, 07, 08, 09	NW -(20/10)m NW706, NW712	F	0,8 l	
	Input Classic	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Xpro	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,5 l	
	Juwel Top	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 l	
	Kantik	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NW712 VV214	F	2,0 l	
	Librax	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	
	Matador	W (ohne DU),R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,0 l	
	Opus Top	W,G,R	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	1,5 l	
	Pronto Plus	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
Property 180 SC	WW, G	08, 09		F	0,5 l	Um einer Resistenzbildung vorzubeugen möglichst in Kombination mit einem weiteren mehltauwirksamen Mittel einsetzen!	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Property Start = Property 180 SC + Opus Top	WW, G	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	0,5 + 1,5 l	Um einer Resistenzbildung vorzubeugen möglichst in Kombination mit einem weiteren mehltauwirksamen Mittel einsetzen!
	Prosaro, Sympara	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,0 l	
	Siltra Xpro	W,G	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	W,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l	
		G	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW705	F	1,0 l	
	Soleil Vegas Pack	W	05, 07, 08, 09	NW 5(0/0/0)m	42	1,0 + 0,2 l	
	Talius	W,G,R,T	05, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	0,25 l	
	Vegas	W,G,R,T,H	09		F	0,25 l	
	Vegas-Proline Pack	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,25 + 0,8 l	
	Vegas Pronto Plus Pack	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	0,2 + 1,0 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Achat	W,G,R	09		F	0,5 l	Bei warmer Witterung schnelle Vermehrung möglich, daher in der Ährenphase auf langanhaltenden Fungizidschutz achten.
	Adexar	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	
	Adexar-Amistar Opti Pack	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,4 + 1,4 l	
	Adexar-Diamant Pack	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,1 + 1,1 l	
	Agent	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW 20(10/5/5)m NW706, NT102	F	1,0 l	
	Amistar Opti, Zakeo Opti	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	2,5 l	
	Amistar Opti Gladio	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10)m NW706, NW712 NG331	F	1,8 + 0,6 l	
	Ampera	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	W,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
		G, H	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW706	F	1,2 l	
	Aviator Xpro	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l G: 1,0 l	
	Aviator Xpro Opti = Aviator Xpro + Amistar Opti	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW706, NG331	F	1,0 + 1,5 l	
	Azoxystar	W,G,R,T,H	09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l	
Bontima	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m, NG342-1	F	2,0 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Bontima Opti = Bontima + Zakeo Opti	G	07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331, NG342-1	F	1,5 + 1,5	
	Capalo	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW701	F	2,0 l	
	Caramba, Plexeo	W,G,R	02, 05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m	F	1,5 l	
	Ceralo	W,G,R	05, 06, 08, 09	NW 20(15/15/10)m NW706	F	1,2 l	
	Cerix	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	2,5 l	
	Champion	W,G,R	07, 08, 09	NW 5(0/0/0)m NW701	F	1,5 l	
	Champion-Diamant-Doppelgebinde	W,G,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	0,9 + 0,9 l	
	Cirkon	W,WR	07, 09	NW 5(0/0/0)m	35	1,1 l	
	Comet	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Comet + Curbatur	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	0,3 + 0,6 l	
	Diamant	W,G,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,75 l	
	Elatus Era	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42 G: F	1,0 l	
	Elatus Era Opti = Elatus Era + Amistar Opti	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	42 G: F	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	42 G: F	1,0 + 0,33 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Elatus Plus	W,G,R,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Elatus Plus Plexeo	W,G,R,T	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 + 1,125 l	
	Eleando	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	3,0 l	
	Epoxion	W,G,R,T	08, 09	NW 5(5/0/0)m NW706	F	1,0 l	
	Epoxion Top	W,R,T	05, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706, NW712	F	2,5 l	
	Fandango	W,G,R,T	05, 07, 08,	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
	Fandango-Folicur Pack	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701, NT101	F	0,75 + 0,75 l	
	Fandango-Input Spezial	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	0,75 + 0,75 l	
	Fezan	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW705	F	1,0 l	
	Folicur	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701, NT101	F	1,25 l W: 1,0 l	
	Gigant Opti = Gigant + Zakeo Opti	W,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NG342-1	F	1,0 l	
	Gladio	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/10)m NW706, NW712	F	0,8 l	
	Helocur 250 EW	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,0 l	
	Input Classic	W,G,R,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Input Xpro	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,5 l	Magnello hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51). Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Juwel Top	W,G,R	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 l	
	Kantik	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(/15/15)m NW706, NW712 VV214	F	2,0 l	
	Librax	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	
	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	1,0 l	
	Matador	W (ohne DU),R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,0 l	
	Opus Top	W,G,R	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	1,5 l	
	Orius	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l W: 1,25 l	
	Osiris	W,G,R,T,H	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	3,0 l H: 2,5 l	
	Priaxor	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	35	1,5 l	
	Priaxor-Osiris Pack	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	35	1,0 + 1,0 l	
	Proline, Curbatur	W,G,R	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,8 l	
Pronto Plus	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen	
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Property Start = Property 180 SC + Opus Top	WW, G	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	0,5 + 1,5 l		
	Prosaro, Sympara	W,G,R,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,0 l		
	Rubric	W,G,R,H	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m	F	1,0 l		
	Seguris	W,R,T	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m, NW701, NG342-1	F	1,0 l		
	Seguris Opti = Seguris + Amistar Opti	W,G,R,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m, NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l		
	Siltra Xpro	W,G	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l		
	Skyway Xpro		W,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l	
			G	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW705	F	1,0 l	
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(0/0/0)m	42	1,2 l		
Soleil Vegas Pack	W	05, 07, 08, 09	NW 5(0/0/0)m	42	1,0 + 0,2 l			

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>) an Weizen, Roggen und Triticale, Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>) an Gerste, Haferkronenrost (<i>Puccinia coronata</i>) an Hafer	Taspa	W	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,5 l	Taspa hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51).
	Torero	W,G,R,T,H	09	NW 5(5/0/0)m	F	1,0 l	
	Unix Plexeo Pack	W,G	02, 05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	F	0,5 kg + 1,0 l	
	Vegas-Proline Pack	W,G,R	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,25 + 0,8 l	
	Vegas Pronto Plus Pack	W,G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	0,2 + 1,0 l	
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Adexar	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	Bei feuchtkühler Witterung schnelle Vermehrung möglich, daher bei Befallsbeginn sofort handeln.
	Adexar-Amistar Opti Pack	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,4 + 1,4 l	
	Adexar-Diamant Pack	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,1 + 1,1 l	
	Agent	W	05, 07, 08, 09	NW 20(10/5/5)m NW706, NT102	F	1,0 l	
	Amistar Opti Gladio	W	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/10)m NW706, NW712 NG331	F	1,8 + 0,6 l	
	Ascra Xpro	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
	Aviator Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l	
	Aviator Xpro Opti = Aviator Xpro + Amistar Opti	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW706, NG331	F	1,0 + 1,5 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Azoxystar	W	09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l	
	Caramba, Plexeo	W	02, 05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m	F	1,5 l	
	Ceralo	W,T	05, 06, 08, 09	NW 20(15/15/10)m NW706	F	1,2 l	
	Cerix	W,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	2,5 l	
	Champion	W	07, 08, 09	NW 5(0/0/0)m NW701	F	1,5 l	
	Champion-Diamant-Doppelgebinde	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	0,9 + 0,9 l	
	Comet	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Comet + Curbatur	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	0,3 + 0,6 l	
	Diamant	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,75 l	
	Elatus Era	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Opti = Elatus Era + Amistar Opti	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus	W	05, 07, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarket. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Elatus Plus Plexeo	W	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 + 1,125 l	
	Eleando	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	3,0 l	
	Fandango	W,T	05, 07, 08,	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
	Fandango-Folicur Pack	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701, NT101	F	0,75 + 0,75 l	
	Fandango-Input Spezial	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	0,75 + 0,75 l	
	Gigant	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NG342-1	F	1,0 l	
	Gigant Opti = Gigant + Zakeo Opti	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l	
	Gladio	W	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/10)m NW706, NW712	F	0,8 l	
	Helocur 250 EW	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,0 l	
	Input Classic	W	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Juwel Top	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 l	
	Librax	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	
	Matador	W (ohne DU)	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,0 l	
	Minister	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,0 l W,G : 0,75 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Opus Top	W,G	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	1,5 l	Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Osiris	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	3,0 l	
	Priaxor	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	35	1,5 l	
	Priaxor-Osiris Pack	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	35	1,0 + 1,0 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,8 l	
	Pronto Plus	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Property Start = Property 180 SC + Opus Top	WW	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	0,5 + 1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,0 l	
	Rubric	W,G	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m	F	1,0 l	
	Seguris	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m, NW701, NG342-1	F	1,0 l	
	Seguris Opti = Seguris + Amistar Opti	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m, NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l	
	Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l	
	Taspa	W	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,5 l	Taspa hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51).

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Gelbrost (<i>Puccinia striiformis</i>)	Torero	W	09	NW 5(5/0/0)m	F	1,0 l	
	Unix Plexeo Pack	W,G	02, 05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	F	0,5 kg + 1,0 l	
	Vegas-Proline Pack	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,25 + 0,8 l	
	Vegas Pronto Plus Pack	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	0,2 + 1,0 l	
<i>Rhynchosporium</i> -Blattfleckenkrankheit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Achat	G	09		F	0,5 l	Längere Nässeperioden fördern die Krankheitsausbreitung. Fungizideinsatz ab BBCH 31 je nach Temperatur 7 - 14 Tage nach Infektionsbeginn.
	Adexar	G,R	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	
	Adexar-Amistar Opti Pack	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,4 + 1,4 l	
	Adexar-Diamant Pack	G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,1 + 1,1 l	
	Agent	G,R	05, 07, 08, 09	NW 20(10/5/5)m NW706, NT102	F	1,0 l	
	Amistar Opti, Zakeo Opti	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	2,5 l	
	Amistar Opti Gladio	G, R	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/10)m NW706, NW712 NG331	F	1,8 + 0,6 l	
	Ampera	G,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
		G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW706	F	1,2 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Rhynchosporium</i> -Blattfleckenkrankheit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Aviator Xpro	G,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l G: 1,0 l	
	Aviator Xpro Opti = Aviator Xpro + Amistar Opti	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW706, NG331	F	1,0 + 1,5 l	
	Azoxystar	G,R,T	09	NW5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l	
	Bontima	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m, NG342-1	F	2,0 l	
	Bontima Opti = Bontima + Zakeo Opti	G	07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331, NG342-1	F	1,5 + 1,5 l	
	Capalo	G	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW701	F	2,0 l	
	Caramba, Plexeo	G,R	02, 05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m	F	1,5 l	
	Ceralo	G,R	05, 06, 08, 09	NW 20(15/15/10)m NW706	F	1,2 l	
	Cerix	G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	2,5 l	
	Champion	G,R	07, 08, 09	NW 5(0/0/0)m NW701	F	1,5 l	
	Champion-Diamant-Doppelgebinde	G,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	0,9 + 0,9 l	
	Cirkon	G,WR	07, 09	NW 5(0/0/0)m	35	1,1 l	
	Comet	G,R	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Comet + Curbatur	G,R	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	0,3 + 0,6 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Rhynchosporium</i> -Blattfleckenkrankheit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Diamant	G,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,75 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarket. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Elatus Era	G,R	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	
	Elatus Era Opti = Elatus Era + Amistar Opti	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	G,R	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus	G,R	05, 07, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 l	
	Elatus Plus Plexeo	G,R	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 + 1,125 l	
	Eleando	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	3,0 l	
	Epoxion	G,R	08, 09	NW 5(5/0/0)m NW706	F	1,0 l	
	Epoxion Top	G	05, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706, NW712	F	2,5 l	
	Fandango	G,R	05, 07, 08,	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,5 l G: 1,25 l	
	Fandango-Folicur Pack	G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701, NT101	F	0,75 + 0,75 l	
	Fandango-Input Spezial	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	0,75 + 0,75 l	
Folicur	G,R	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701, NT101	F	1,25 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Rhynchosporium</i> - Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i>)	Gigant	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NG342-1	F	1,0 l	
	Gigant Opti = Gigant + Zakeo Opti	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l	
	Gladio	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/10)m NW706, NW712	F	0,8 l	
	Input Classic	G,R	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Xpro	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,5 l	
	Juwel Top	G,R	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 l	
	Kantik	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NW712 VV214	F	2,0 l	
	Librax	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	
	Matador	R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,0 l	
	Mirage 45 EC	G,R	09	NW 10(5/5/0)m NW705	F	1,2 l	
	Opus Top	G,R	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	1,5 l	
	Orius	G,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
Osiris	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	3,0 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Rhynchosporium</i> -Blattfleckenkrankheit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Priaxor	G,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	35	1,5 l	Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Priaxor-Osiris Pack	G,R	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	35	1,0 + 1,0 l	
	Proline, Curbatur	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,8 l	
	Pronto Plus	G,R	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Property Start = Property 180 SC + Opus Top	G	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	0,5 + 1,5 l	
	Prosaro, Sympara	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,0 l	
	Rubric	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m	F	1,0 l	
	Seguris Opti = Seguris + Amistar Opti	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m, NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l	
	Siltra Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	W,R,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l	
G		07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW705	F	1,0 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Rhynchosporium</i> - Blattfleckenkrank- heit (<i>Rhynchosporium</i> <i>secalis</i>)	Torero	G,R,T	09	NW 5(5/0/0)m	F	1,0 l	
	Unix Plexeo Pack	G	02, 05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	F	0,5 kg + 1,0 l	
	Vegas-Proline Pack	G,R	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,25 + 0,8 l	
Netzfleckenkrank- heit (<i>Pyrenophora</i> <i>teres</i>)	Achat	G	09		F	0,5 l	Zu Beginn der Befallsausbreitung bis Ende des Ährenschiebens. Ausbreitung durch feuchtwarme Witterung begünstigt.
	Adexar	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	
	Adexar-Amistar Opti Pack	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,4 + 1,4 l	
	Adexar-Diamant Pack	G	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,1 + 1,1 l	
	Agent	G	05, 07, 08, 09	NW 20(10/5/5)m NW706, NT102	F	1,0 l	
	Amistar Opti, Zakeo Opti	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	2,5 l	
	Amistar Opti Gladio	G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/10)m NW706, NW712 NG331	F	1,8 + 0,6 l	
	Ampera	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
	Ascra Xpro	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW706	F	1,2 l	
	Aviator Xpro	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,0 l	
	Aviator Xpro Opti = Aviator Xpro + Amistar Opti	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW706, NG331	F	1,0 + 1,5 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Azoxystar	G	09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l	
	Bontima	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m, NG342-1	F	2,0 l	
	Bontima Opti = Bontima + Zakeo Opti	G	07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331, NG342-1	F	1,5 + 1,5	
	Capalo	G	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW701	F	2,0 l	
	Caramba, Plexeo	G	02, 05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m	F	1,5 l	
	Cerix	G	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	2,5 l	
	Ceralo	G	05, 06, 08, 09	NW 20(15/15/10)m NW706	F	1,2 l	
	Champion	G	07, 08, 09	NW 5(0/0/0)m NW701	F	1,5 l	
	Champion-Diamant- Doppelgebinde	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	0,9 + 0,9 l	
	Cirkon	G	07, 09	NW 5(0/0/0)m	35	1,1 l	
	Comet	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
	Comet + Curbatur	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	0,3 + 0,6 l	
	Diamant	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,75 l	
Elatus Era	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Elatus Era Opti = Elatus Era + Amistar Opti	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,0 + 1,5 l	Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Elatus Era Sympara	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus	G	05, 07, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 l	
	Elatus Plus Plexeo	G	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 + 1,125 l	
	Eleando	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	3,0 l	
	Epoxion	G	08, 09	NW 5(5/0/0)m NW706	F	1,0 l	
	Epoxion Top	G	05, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706, NW712	F	2,5 l	
	Fandango	G	05, 07, 08,	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,25 l	
	Fandango-Input Spezial	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	0,75 + 0,75 l	
	Folicur	G	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701, NT101	F	1,25 l	
	Gigant	G	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NG342-1	F	1,0 l	
	Gigant Opti = Gigant + Zakeo Opti	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l	
Gladio	G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/10)m NW706, NW712	F	0,8 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Input Classic	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Input Xpro	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,5 l	
	Juwel Top	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 l	
	Kantik	G	05, 07, 08, 09	NW -(-/15/15)m NW706, NW712 VV214	F	2,0 l	
	Librax	G	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	
	Opus Top	G	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	1,5 l	
	Orius	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
	Osiris	G	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	3,0 l	
	Priaxor	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	35	1,5 l	
	Priaxor-Osiris Pack	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	35	1,0 + 1,0 l	
	Proline, Curbatur	G	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,8 l	
	Property Start = Property 180 SC + Opus Top	G	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	0,5 + 1,5 l	
Prosaro, Sympara	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,0 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)	Rubric	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m	F	1,0 l	
	Seguris	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m, NW701, NG342-1	F	1,0 l	
	Seguris Opti = Seguris + Amistar Opti	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m, NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l	
	Siltra Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW705	F	1,0 l	
	Torero	G	09	NW 5(5/0/0)m	F	1,0 l	
	Unix Plexeo Pack	G	02, 05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	F	0,5 kg + 1,0 l	
	Vegas-Proline Pack	G	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,25 + 0,8 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	Adexar	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	Die Ausbreitung wird begünstigt durch warme, wechselfeuchte Witterungsabschnitte mit hoher Luftfeuchte. Besonders hohe Gefährdung bei Weizenvorfrucht mit Minimalbodenbestellung und anfälligen Sorten.
	Adexar-Amistar Opti Pack	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,4 + 1,4 l	
	Adexar-Diamant Pack	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,1 + 1,1 l	
	Agent	W	05, 07, 08, 09	NW 20(10/5/5)m NW706, NT102	F	1,0 l	
	Amistar Opti, Zakeo Opti	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	2,5 l	
	Amistar Opti Gladio	W	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/10)m NW706, NW712 NG331	F	1,8 + 0,6 l	
	Ascra Xpro	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
	Aviator Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l	
	Aviator Xpro Opti = Aviator Xpro + Amistar Opti	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW706, NG331	F	1,0 + 1,5 l	
	Capalo	W	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW701	F	2,0 l	
	Cerix	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	2,5 l	
	Champion-Diamant-Doppelgebinde	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	0,9 + 0,9 l	
	Comet	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,25 l	
Comet + Curbatur	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	0,3 + 0,6 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	Diamant	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,75 l	
	Elatus Era Opti = Elatus Era + Amistar Opti	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,0 + 1,5 l	
	Eleando	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	3,0 l	
	Epoxion	W	08, 09	NW 5(5/0/0)m NW706	F	1,0 l	
	Fandango	W	05, 07, 08,	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
	Fandango-Input Spezial	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	0,75 + 0,75 l	
	Gigant Opti = Gigant + Zakeo Opti	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l	
	Gladio	W	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/10)m NW706, NW712	F	0,8 l	
	Input Classic	W	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Xpro	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,5 l	
	Juwel Top	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 l	
	Librax	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	
	Opus Top	W	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	1,5 l	
	Osiris	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	3,0 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
DTR-Blattdürre (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	Priaxor	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	35	1,5 l	Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Priaxor-Osiris Pack	W	07, 08, 09	NW10 (5/5/0)m NW701	35	1,0 + 1,0 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,8 l	
	Property Start = Property 180 SC + Opus Top	WW	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	0,5 + 1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,0 l	
	Seguris Opti = Seguris + Amistar Opti	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m, NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l	
	Siltra Xpro	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l	
	Taspa	W	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,5 l	
	Vegas-Proline Pack	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,25 + 0,8 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Adexar	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	Feuchtwarme Witterung begünstigt Infektionen durch <i>Septoria nodorum</i> .
	Adexar-Amistar Opti Pack	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,4 + 1,4 l	Feuchtkühle Witterung begünstigt Infektionen durch <i>Septoria tritici</i> .
	Adexar-Diamant Pack	W,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,1 + 1,1 l	Dithane NeoTec und Tridex DG Raincoat sind reine Kontaktfungizide und haben damit nur eine vorbeugende Wirkung. Die systemischen Fungizide besitzen neben einer vorbeugend-schützenden auch eine heilende Wirkung, d.h. sie erfassen auch noch einige Tage alte Septoria-Infektionen.
	Amistar Opti, Zakeo Opti	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	2,5 l	Taspa ist in Weizen nur gegen <i>Septoria nodorum</i> zugelassen, Agent, Ampera, Amistar Opti/Zakeo Opti, Champion, Epoxion, Epoxion Top, Input Xpro, Kantik, Librax, Osiris, Priaxor, Prosaro/Sympara, Rubric, Siltra Xpro und Seguris nur gegen <i>Septoria tritici</i> .
	Amistar Opti Gladio	W, T	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/10)m NW706, NW712 NG331	F	1,8 + 0,6 l	Die reinen Strobilurin-Präparate Azoxystar, Comet und Torero besitzen aufgrund weitverbreiteter Resistenz keine ausreichende Wirkung gegen <i>Septoria tritici</i> .
	Ascra Xpro	W,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
	Aviator Xpro	W,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l	
	Aviator Xpro Opti = Aviator Xpro + Amistar Opti	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW706, NG331	F	1,0 + 1,5 l	
	Azoxystar	W	09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l	
	Capalo	W	07, 08, 09	NW -(15/10/5)m NW701	F	2,0 l	
	Caramba, Plexeo	W,T	02, 05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m	F	1,5 l	
	Cerix	W,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	2,5 l	
Ceralo	W,T	05, 06, 08, 09	NW 20(15/15/10)m NW706	F	1,2 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen	
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Champion	W	07, 08, 09	NW 5(0/0/0)m NW701	F	1,5 l	Dithane NeoTec und Tridex DG Raincoat enthalten 16 % Mangan und 2 % Zink.	
	Champion-Diamant-Doppelgebilde	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	0,9 + 0,9 l		
	Cirkon	W	07, 09	NW 5(0/0/0)m	35	1,1 l		
	Comet + Curbatur	W,T	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	0,3 + 0,6 l		
	Diamant	W,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,75 l		
	Dithane NeoTec, Tridex DG Raincoat	W	07, 08, 09	NW -(/20/10)m NT102	F	2,13 kg		
	Elatus Era	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l		
	Elatus Era Opti = Elatus Era + Amistar Opti	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,0 + 1,5 l		
	Elatus Era Sympara	W,T	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l		
	Elatus Plus	W,T	05, 07, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 l		Elatus Plus wird nicht solo vermarket. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Elatus Plus Plexeo	W,T	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 + 1,125 l		
	Eleando	W	05, 07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	3,0 l		
Epoxion	W,T	08, 09	NW 5(5/0/0)m NW706	F	1,0 l			

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Epoxion Top	W	05, 08, 09	NW -(20/15/10)m NW706, NW712	F	2,5 l	Magnello hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51).
	Fandango	W,T	05, 07, 08	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
	Fandango-Input Spezial	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	0,75 + 0,75 l	
	Gigant	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NG342-1	F	1,0 l	
	Gigant Opti = Gigant + Zakeo Opti	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l	
	Gladio	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10)m NW706, NW712	F	0,8 l	
	Input Classic	W,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
	Input Xpro	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,5 l	
	Juwel Top	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 l	
			07, 08, 09	NW 10(10/5/5)m NW705	F	1,0 l	
	Kantik	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(15/15)m NW706, NW712 VV214	F	2,0 l	
	Librax	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	
	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	1,0 l	
Matador	W (ohne DU)	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,0 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Mirage 45 EC	W	09	NW 10(5/5/0)m NW705	F	1,2 l	Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Opus Top	W,T	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	1,5 l	
	Orius	T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
	Osiris	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	3,0 l	
	Priaxor	W,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	35	1,5 l	
	Priaxor-Osiris Pack	W,T	07, 08, 09	NW10 (5/5/0)m NW701	35	1,0 + 1,0 l	
	Proline, Curbatur	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,8 l	
	Property Start = Property 180 SC + Opus Top	WW	07, 08, 09	NW 20(15/10/5)m NW701	F	0,5 + 1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,0 l	
	Rubric	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m	F	1,0 l	
	Seguris	W,T	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m, NW701, NG342-1	F	1,0 l	
	Siltra Xpro	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l	
Seguris Opti = Seguris + Amistar Opti	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m, NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>) und Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>)	Skyway Xpro	W,T	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l	Taspa hat die Zulassung ab Beginn des Ährenschiebens (BBCH 51).
	Taspa	W	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,5 l	
	Torero	W	09	NW 5(5/0/0)m	F	1,0 l	
	Unix Plexeo Pack	W,T	02, 05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW706	F	0,5 kg + 1,0 l	
	Vegas-Proline Pack	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,25 + 0,8 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Ampera	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,5 l	Hohe Infektionsgefahr bei Weizen nach Vorfrucht Mais, nicht-wendender Bodenbearbeitung, anfälligen Weizensorten und warmer Witterung mit einzelnen gewittrigen Niederschlägen Mitte des Ährenschiebens bis Ende der Weizenblüte. Don-Q und Topsin vermindern vorrangig den Mykotoxingehalt, weniger den sichtbaren Ährenbefall und sind zur Bekämpfung weiterer Krankheiten mit anderen Fungiziden mischbar (z. B. im Fezan-Topsin-Pack = 0,8 l Fezan + 0,8 kg Topsin). Elatus Era oder Skyway Xpro sollten zur Resistenzvermeidung in Spritzfolgen nur bei Vorbehandlung ohne Carboxamidpräparate (z.B. Adexar, Ceriax, Champion, Elatus Era, Elatus Plus, Gigant, Librax, Seguris, Xpro-Produkte) eingesetzt werden.
	Caramba, Plexeo	W	02, 05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m	F	1,5 l	
	Ceralo	W (ohne DU)	05, 06, 08, 09	NW 20(15/15/10)m	F	1,2 l	
	Comet + Curbatur	W	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	0,3 + 0,6 l	
	Don-Q, Topsin	W,T	07, 08, 09	NW 20(10/5/5)m NW701	F	1,1 kg	
	Elatus Era	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	42	1,0 l	
	Elatus Era Sympara	W	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	42	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus Plexeo	W	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 + 1,125 l	
	Fandango	W	05, 07, 08	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,5 l	
	Fandango-Folicur Pack	W	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701, NT101	F	0,75 + 0,75 l	
	Fandango-Input Spezial	W,T	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW701	F	0,75 + 0,75 l	
	Fezan	W (ohne DU)	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	1,0 l	
	Folicur	W (ohne DU)	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701, NT101	F	1,0 l	
	Gigant	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NG342-1	F	1,0 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Fusarium</i> -Arten (Ährenbefall)	Gladio	W	05, 07, 08, 09	NW -(-/-/20)m, NW706, NW712	F	1,0 l	
	Helocur 250 EW	W,T	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	F	1,25 l W: 1,0 l	
	Input Classic	W,T	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW701	F	1,25 l	
	Magnello	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	1,0 l	
	Osiris	W,T	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	3,0 l	
	Proline, Curbatur	W	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	0,8 l	
	Pronto Plus	W	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706, NT101	F	1,5 l	
	Prosaro, Sympara	W	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m	F	1,0 l	
	Soleil	W	05, 07, 08, 09	NW 5(0/0/0)m	42	1,2 l	
	Skyway Xpro	W	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,25 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Ramularia</i> - Sprenkelkrankheit (<i>Ramularia collo- cygni</i>) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken	Adexar	G	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	Die Verbräunungen erscheinen verstärkt nach der Ausbildung des Blattapparats nach einem Witterungsumschwung von bewölkt und regnerisch (strahlungsarm) auf sonnig mit starkem Anstieg der Temperatur und der Globalstrahlung. Fungizide mindern den Schadensverlauf, wenn sie in den empfindlichen Entwicklungsstadien zwischen Fahnenblattstadium (BBCH 39) und Beginn der Blüte (BBCH 61) möglichst kurz vor oder kurz nach einem Witterungsumschwung zu einer Hochstrahlungsphase eingesetzt werden. Die Indikation <i>Ramularia</i> ist derzeit bei Adexar, Amistar Opti/Zakeo Opti, Ascra Xpro, Aviator Xpro, Bontima, Ceriax, Elatus Era, Elatus Plus, Input Xpro, Librax, Osiris, Priaxor, Seguris, Siltra Xpro und Skyway Xpro ausgewiesen.
	Adexar-Amistar Opti Pack	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,4 + 1,4 l	
	Amistar Opti, Zakeo Opti	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	2,5 l	
	Amistar Opti Gladio	G	05, 07, 08, 09	NW -(-/20/10)m NW706, NW712 NG331	F	1,8 + 0,6 l	
	Ascra Xpro	G	05, 07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW701	F	1,2 l	
	Aviator Xpro	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW706	F	1,0 l	
	Aviator Xpro Opti = Aviator Xpro + Amistar Opti	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW706, NG331	F	1,0 + 1,5 l	
	Bontima	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m, NG342-1	F	2,0 l	
	Bontima Opti = Bontima + Zakeo Opti	G	07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331, NG342-1	F	1,5 + 1,5	
	Ceriax	G	05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	2,5 l	

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Ramularia</i> - Sprenkelkrankheit (<i>Ramularia collo-</i> <i>cygni</i>) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken	Elatus Era	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m	F	1,0 l	Ramularia collo-cygni zeigt mittlerweile in ganz Bayern eine zunehmende Resistenz gegen wichtige Fungizidwirkstoffe. Einzig über den Kontaktwirkstoff Chlorthalonil gelingt die Kontrolle noch zuverlässig. Daher wird in allen Behandlungen in der Gerste ab dem Fahnenblattstadium (BBCH 39) eine Zumischung von mindestens 500 g/ha Chlorthalonil (z.B. über Amistar Opti/Zakeo Opti) empfohlen. Elatus Plus wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Elatus Era Opti = Elatus Era + Amistar Opti	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331	F	1,0 + 1,5 l	
	Elatus Era Sympara	G	05, 07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m NW701	F	1,0 + 0,33 l	
	Elatus Plus	G	05, 07, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 l	
	Elatus Plus Plexeo	G	02, 05, 07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	F	0,75 + 1,125 l	
	Fandango-Input Spezial	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	0,75 + 0,75 l	
	Gigant Opti = Gigant + Zakeo Opti	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l	
	Input Classic	G	07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,25 l	
Input Xpro	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/15/15)m NW706	F	1,5 l		

Infos zum Getreidebau

Pilzkrankheiten

Schaderreger	Präparate	Zulassung	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
<i>Ramularia</i> - Sprenkelkrankheit (<i>Ramularia collo- cygni</i>) / Minderung nichtparasitärer Blattflecken	Librax	G	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m	F	2,0 l	Priaxor wird nicht solo vermarktet. Eine Soloanwendung wird auch nicht empfohlen.
	Priaxor	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m	35	1,5 l	
	Priaxor-Osiris Pack	G	07, 08, 09	NW 10(5/5/0)m NW701	35	1,0 + 1,0 l	
	Seguris	G	07, 08, 09	NW 15(10/5/5)m, NW701, NG342-1	F	1,0 l	
	Seguris Opti = Seguris + Amistar Opti	G	05, 07, 08, 09	NW -(20/10/5)m, NW701, NG331, NG342-1	F	1,0 + 1,5 l	
	Siltra Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/0/0)m NW701	F	1,0 l	
	Skyway Xpro	G	07, 08, 09	NW 5(5/5/0)m NW705	F	1,0 l	